



Tortues



Animal party

Taille	Age	Poids	Circonférence de tête
Small	0 - 2 mois	2,0 - 4,5 kg	31 - 36 cm
Medium	2 - 4 mois	4,5 - 7,0 kg	36 - 39 cm
Large	4 - 6 mois	7,0 - 9,0 kg	39 - 44 cm

COMMANDES ET INFORMATIONS:

**Tortlebenelux.com**

CONTACT:

MSC - Medical Supplies Claerebout

msclaerebout@gmail.com



**Le bonnet TORTLE™**

**Prévient et traite la plagiocéphalie  
ou le « syndrome de la tête plate »**



Recommandé  
par  
les pédiatres

**Près d'un enfant sur deux développe le syndrome de la  
tête plate entre 0 et 6 mois**



## L'origine du bonnet


Turtle Products LLC innove avec le bonnet Turtle qui est un dispositif médical breveté et approuvé par la FDA et certifié CE. Imaginé par la pédiatre en néonatalogie Dr Jane Scott en 2012, le Turtle est un bonnet de repositionnement en coton qui aide à la prévention et au traitement du syndrome de la tête plate.

## La plagiocéphalie, c'est quoi ?

Il s'agit d'un aplatissement du crâne, aussi appelé syndrome de la tête plate. Cet aplatissement peut apparaître entre 0 et 6 mois. Près d'un enfant sur deux est touché par ce syndrome car le crâne est encore malléable à cet âge. Les bébés sont habituellement couchés sur le dos et cette position répétée peut contribuer à la formation d'une surface plate. Dans de rares cas, les enfants naissent déjà avec ce syndrome, suite soit au positionnement dans l'utérus, soit à une déformation durant l'accouchement.

## Quels sont les risques ?

Non seulement un positionnement répété du même côté engendre le syndrome de la tête plate, mais il peut provoquer également l'atrophie des muscles du cou, et à long terme des problèmes posturaux. Le torticolis est en effet fréquent chez les bébés qui s'endorment la tête toujours sur le même côté.



## Comment traiter ou prévenir la plagiocéphalie ?

Le bonnet Turtle peut être utilisé au cours des six premiers mois de vie de manière préventive ou thérapeutique. Il traite la plagiocéphalie légère à modérée et permet d'éviter les cas sévères.

Pour éviter ce syndrome, placez le bonnet sur la tête de votre bébé avec le rouleau de support derrière l'oreille. Le bonnet doit bien serrer sur le dessus du crâne, à la nuque et sur les oreilles. Après environ 2-3 heures (ou, par exemple après le repas du bébé), repositionnez de sorte que le rouleau d'appui se trouve derrière l'autre oreille. Ne laissez pas le bonnet pendant la nuit ou lorsque le bébé est sans surveillance.

Pour traiter ce syndrome léger à modéré, placez le bonnet de sorte que le rouleau de support soit positionné au-dessus de la zone plate (affectée) de la tête. La tête du bébé va alors tourner vers une nouvelle position et non plus sur la zone aplatie.

Pour corriger la position d'un bébé qui se tourne systématiquement du même côté, mettez le bonnet de telle sorte que le rouleau de support soit derrière l'oreille, du côté favori, pour étirer doucement les muscles du cou et corriger une mauvaise posture.



tortlebenelux.com

Si pas d'amélioration dans les 2-3 semaines, consultez votre médecin.